

1. domácí úlohy

1a) Popište vyhrávající strategii prvního hráče ve hře $3 \times 3 \times 3$ piškvorky.

Připomeňme, že popis vyhrávající strategie musí 1. hráči vybrat odpověď na libovolný tah protihráče.

1b) Zkonstruuje 2-obarvení $3 \times 3 \times 3$, které nemá žádnou monochromatickou kombinatorickou přímku.

2) Dokažte, že každé 2-obarvení $3 \times 3 \times 3 \times 3$ obsahuje monochromatickou kombinatorickou přímku.

3a) Dokažte, že každé r -obarvení $\{1, 2\}^r$ obsahuje monochromatickou kombinatorickou přímku.

Všimněte si, že důkaz Hales-Jewettovy věty z přednášky garantuje monochromatickou kombinatorickou přímku v obarveních $\{1, 2\}^d$ pouze když $d \geq r^2 + r^{2r^2}$.

3b) Pro každé přirozené číslo $r \geq 2$ zkonstruuje r -obarvení $\{1, 2\}^{r-1}$ takové, že neobsahuje žádnou monochromatickou kombinatorickou přímku.

4) Dokažte “vícerozměrnou variantu” Hales-Jewettovy věty: pro každé $\ell, r, d \in \mathbb{N}$ existuje přirozené číslo $N := N(\ell, r, d)$ takové, že libovolné r -obarvení $\{1, 2, \dots, \ell\}^N$ obsahuje monochromatickou d -krychli. Jinými slovy, pro každé $\chi : \{1, 2, \dots, \ell\}^N \rightarrow \{1, \dots, r\}$ existuje vzor $\tilde{\alpha}$ délky N obsahující d různých druhů hvězdiček $\star_1, \star_2, \dots, \star_d$ (každou z nich alespoň jednou) takový, že

$$\chi(b) = \chi(b') \quad \forall b, b' \in \left\{ \tilde{\alpha}(x_1, \dots, x_d) \mid x_1, \dots, x_d \in \{1, 2, \dots, \ell\} \right\},$$

kde $\tilde{\alpha}(x_1, \dots, x_d)$ značí bod v $\{1, 2, \dots, \ell\}^N$ získaný z α substitucí $\star_i \rightarrow x_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, d\}$.

Hint: Převeďte problém na hledání monochromatické kombinatorické přímký v r -obarvení krychle

$$\left\{ 1, 2, \dots, \ell^d \right\}^{N/d}.$$

*) Dokažte tzv. van der Wardenovu větu: pro každé $r, k \in \mathbb{N}$ existuje $N \in \mathbb{N}$ takové že libovolné r -obarvení $\chi : \{1, \dots, N\} \rightarrow \{1, \dots, r\}$ obsahuje monochromatickou aritmetickou posloupnost délky k . Jinými slovy, existují nějaké kladné $a, d \in \mathbb{N}$ takové, že

$$a + (k - 1)d \leq N \quad \text{a} \quad \chi(a) = \chi(a + d) = \chi(a + 2d) = \dots = \chi(a + (k - 1)d).$$